

***Herzlich
Willkommen***



***XV. Onkologische Fachtagung
25. Mai 2012***

*Spezielle Pflege bei Mammakarzinom -
patienten im Brustzentrum Ludwigsfelde*



Schwester Sabrina Preusche



Themen

- *Management von Hand - Fuß - Syndrom
Nagelveränderungen*
- *Neue Mistelstudie mit
Falldarstellung*



Hand - Fuß - Syndrom

- ***Gradeinteilung (3 Stadien)***

***Hand - Fuß - Syndrom
Grad 1***





***Hand - Fuß - Syndrom
Grad 3***



Nach ca. 4 Wochen



Prävention / Pflege

- ***Druck, Reibung, Hitze meiden***
- ***Lockere Kleidung, weite und bequeme Schuhe***
- ***Kurzes Duschen, Haut mit weichen Handtuch trocken tupfen***

Prävention / Pflege

- ***Körperpflegemittel mit Alkohol, äther. Ölen, ... meiden***
- ***Starke Putzmittel meiden***
- ***Direkte Sonneneinstrahlung und übermäßige körperliche Aktivitäten meiden***

Therapie / Pflege

- ***Kühlung Hände und Füße während Chemotherapie, besonders bei Docetaxel***
- ***Hautpflege, z.B. Neutrogena, TAO Produkte, Bepanthen Salbe***
- ***Ggf. antiseptische Bäder (z.B. mit Braunol, Tannosynt)***



Kühlhandschuhe und -füßlinge

- ***Einweg - Vlieshandschuhe***
- ***15 min vor Chemo bis 15 Min. nach Chemo, nach 45 min Wechsel***
- ***Reinigung: mit Seife und Wasser abwischen, abspülen, trocknen***

Nicht in Wasser trinken



HYPOTHERMIA SLIPPERS
Supportive Care In Cancer

Elasto-Gel™

"Treating the world well"®

www.elastogel.com • 800-247-9951



Indication

Aids in the reduction of nail and skin toxicity associated with Docetaxel (Taxotere®)

Contains

- 1 pair of hypothermia slippers (each individually packed in a plastic bag)
- 2 disposable inner slippers

Instructions for use included inside



Medical Device, Class I, European Directive 93/42/EEC

Item # SL3000

LOF 060211C



Nagelveränderungen

- ***Besonders unter Docetaxel***
- ***Verfärbung, Wölbung, Nagelverlust***
- ***Bakteriologie, Histologie :
Melanom ? Pilzinfektion ?***


Unter Taxotere



Unter Taxotere



*Unter Taxotere und
Xeloda*



Vor Beginn der Chemotherapie

- ***Gut deckender Nagellack, Gelverstärkung***
- ***Hydrierender Nagelschutz mit Visurea***
Bei Nagelpilz : Batrafen
Nach Arztabsprache
- ***Nägel kurz schneiden, feilen***



Während Chemotherapiegabe



- *Kühlung Hände und Füße*



Aha ...

***Kühlung auch gut zur Prophylaxe
bei peripheren Neurotoxizitäten***

Mistelstudie



<http://www.rottapharm-madaus.de/>

*Wenn der Peter
mit der Hanne ...*

Mistelstudie



- ***HELIXOR A***
- ***Klinische Studien in adjuvanter und palliativer Situation erfolgt***
- ***Evidenz für HELIXOR A als supportive Therapieoption bei Chemotherapien***



Mistelstudie

http://www.krebsgesellschaft.de/pat_tdm_200711_misteltherapie_leitartikel,200076.html

- ***Verbesserung der Verträglichkeit der Chemotherapie und Lebensqualität :***

Fatigue, Übelkeit / Erbrechen, Schmerzen, Schlaf- und Appetitlosigkeit, Neutropenie

Keine negativen
Interaktionen mit
onkologischen
Standardtherapeutika



Mistelstudie HELMA

- ***Dauer: 18 Wochen***
- ***Tagebuch, 6 wöchentlich
Lebensqualitätsbogen***
- ***NW und ECOG***
- ***Metastasierte Situation***

Fallvorstellung

● 41 jährige Patientin

Mamma-Ca li pT2 N1a
Metaplast. Sarkomatoides Ca
Triple neg.

Lk - Metastasen im
Narbenbereich

Lk - Metastase re Axilla

ND: Penicillinallergie, Laktosein -
toleranz, verstärkte Neigung zur
Ekzembildung

Therapie: OP 11/11
zzt. Chemotherapie

● 45 jährige Patientin

Mamma-Ca pT2 N0 L0 V0 R0
G3 (ED 2010)
Lk - Metastasen li Leiste 11/11,

Lungenmetastasen

Hirnmetastasen 12/11

Therapie: OP 08/10
zzt. Chemotherapie
Radiatio abgeschlossen
Bevacicumab

Therapievorschlag

- *HELIXOR A*
grundsätzlich bei
Allergieneigung und
Chemotherapie
- *3 x wöch.1 subkutane*
Injektion
- *Bei Krankheitsprogress*
und zunehmend
reduzierten AZ tgl.
Injektion
- *Anfangsdosis : 0,01 mg*
bis max. 50 mg
- *Keine Misteltherapie bei*
erhöhtem bzw.
ansteigendem
Hirndruck
- *3 x wöch.1 subkutane*
Injektion
- *Nach Chemotherapie*
tgl. Injektion
- *Anfangsdosis : 1,00 mg*
bis max. 200 mg



http://www.krebsgesellschaft.de/pat_tdm_102011_misteltherapie_leitartikel,200076.html

- ***Injektionen an wechselnden Stellen des Bauches bzw. der Oberschenkel, entzündete Hautareale und Bestrahlungsfelder meiden***
- ***Rest in Ampullen verwerfen***

Erwünschte Reaktionen

- ***Entzündliche Lokalreaktion bis max. 5 cm an der s.c. Injektionsstelle***
- ***Besserung AZ***

Übermäßige Reaktionen

- ***Übermäßige Lokalreaktion über 5 cm Durchmesser***
- ***Während Chemotherapie/Bestrahlung besteht in manchen Fällen eine verstärkte Neigung zu entzündlichen Lokalreaktionen***
- ***Allergische Reaktion (z.B. Urtikaria)***



***Forschung geht weiter
in der
Supportivtherapie***



***Dieser Vortrag wird unserer
Oberärztin
Frau Alexandra Wurziger
gewidmet.***

In stillem Gedenken.

*Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!*

